

Diabetes

MUST NEVER WIN!

قرص ترکیبی روکش دار سیتاگلیپتین ۵۰ میلی گرم + متفورمین ۵۰۰ میلی گرم

انسولین هورمونی است که به طور طبیعی در بدن، توسط لوزالمعده ساخته می‌شود. این هورمون به کنترل سطح قند خون کمک می‌کند. اگر بدن شما به اندازه کافی انسولین را برای رفع نیازهایش نسازد و یا اگر از انسولینی که می‌سازد، به طور مؤثر استفاده نکند، در نتیجه بیماری به نام دیابت ملیتوس (دیابت شیرین) ایجاد می‌شود. افراد مبتلا به دیابت برای کنترل مقدار گلوکز (قند) در خون نیاز به درمان دارند؛ زیرا که کنترل خوب میزان قند خون، خطر ابتلا به عوارض بعدی را کاهش می‌دهد. قند خون برخی از افراد، با ایجاد تغییرات در رژیم غذایی، کنترل می‌شود، اما برای کنترل قند خون در افراد دیگر، دارو در کنار تغییر رژیم غذایی تجویز می‌شود. سیتاگلیپتین/متفورمین اجازه می‌دهد تا بدن از مقدار پایین انسولینی که در دیابت نوع ۲ دیده می‌شود، بهترین استفاده را کند.



ساخت شرکت پارس دارو
تهران | ایران

صدای مشتری: ۷۴۳۷۳
www.parsdarou.ir



نام ژنریک: سیتاگلیپتین / متفورمین

دسته دارویی: مهار کننده دی پپتیل پپتیداز تیپ چهار (DPP-4) / بی گوانید - کاهنده قند خون در بیماران مبتلا به دیابت تیپ ۲.

موارد مصرف: درمان جایگزین در بزرگسالان مبتلا به دیابت ملیتوس تیپ ۲ که با درمان تک دارویی سیتاگلیپتین یا متفورمین به پاسخ دلخواه نرسیده ایم، در کنار ورزش و کنترل رژیم غذایی زمانی.

این دارو ترکیبی از دو داروی **سیتاگلیپتین** و **متفورمین** است. استفاده از داروهای ترکیبی به کاهش تعداد قرص مصرفی بیمار کمک می‌کند که نقش مؤثری در افزایش ترشح انسولین به خون ایفا می‌کند؛ همچنین این دارو با کاهش ساخت قندهای ساده توسط کبد، کاهش جذب کربوهیدرات از روده‌ها و کمک به افزایش حساسیت سلول‌ها برای پاسخگویی به انسولین کمک می‌کند تا قند خون بیماران دیابتی به مؤثرترین شکل کنترل گردد.

نحوه مصرف: بزرگسالان: مصرف دارو با مقدار یکبار در روز همراه با غذا شروع می‌شود که به منظور کاهش عوارض جانبی ناشی از مصرف متفورمین، به تدریج افزایش می‌یابد. حداکثر مقدار مصرف دارو، دو قرص در روز است.

مصرف در دوران بارداری: دارو در رده B بارداری بوده و می‌تواند زیر نظر پزشک در دوران بارداری استفاده شود.

مصرف در دوران شیردهی: میزان ترشح دارو در شیر مادر شناخته شده نیست بنابراین توصیه می‌شود زنان شیرده با احتیاط و زیر نظر پزشک این دارو را مصرف کنند.

1-Physicians' Desk Reference 2015

2-Drug Facts and Comparisons 2007

