

Prigra[®]
Sildenafil | ODT

Sildenafil Orodispersible
Tablet (ODT) 50 mg

شروع اثر سریع تر به دلیل انحلال و آزاد سازی سریع دارو نسبت به داروهای مشابه

باز شونده در دهان

سرعت عمل بالا

اولین بار در ایران

مزایای فرآورده‌های باز شونده در دهان

- شروع اثر سریع تر به دلیل انحلال و آزاد سازی سریع دارو
- مصرف راحت و آسان
- جذب سریع تر (پیش از معده) از مخاط دهان و فراهمی زیستی بالاتر (عدم وجود اثر عبور اول کبدی)
- مصرف بدون نیاز به نوشیدن آب (مفید بخصوص در زمان‌های عدم دسترسی به آب)
- ایجاد حس مطلوب (طعم خوشایند نعنای) در دهان
- ایمنی مناسب به دلیل عدم احتمال گیر کردن دارو در گلو

قرص سیلدنافیل بازشونده در دهان ۵۰ میلی‌گرم

پریگرا® به صورت قرص‌های باز شونده در دهان با طعم نعناع و حاوی ۵۰ میلی‌گرم ماده موثره سیلدنافیل است. این دارو برای درمان بالغین مذکر مبتلا به اختلال نعوظ (که گاهی تحت عنوان ناتوانی جنسی مطرح می‌گردد) می‌باشد. در این اختلال فرد قادر به حفظ حالت تحریک شدگی (سفتی) آلت تناسلی در طی فعالیت جنسی نیست و این امر موجب عدم دستیابی وی به رضایتمندی جنسی می‌گردد. اثر درمانی پریگرا®، به شرط وجود تحریک جنسی حاصل می‌شود.

روش مصرف پریگرا®:

دوز توصیه شده پریگرا® ۵۰ میلی‌گرم است که باید حدود یک ساعت پیش از آغاز فعالیت جنسی مصرف شود. مصرف این دارو همراه غذا ممکن است منجر به ایجاد تاخیر در شروع اثربخشی آن در مقایسه با زمانی گردد که بدون غذا مصرف می‌شود. نوشیدن الکل که خود می‌تواند موقتا موجب ایجاد اختلال در نعوظ شود بر اثربخشی این دارو نیز اثر کاهنده دارد.

قرص باز شونده در دهان پریگرا® باید روی زبان قرار داده شود و پیش از باز شدن آن بلعیده نشود. دوز توصیه شده پریگرا® در صورت نیاز و با توجه به اثربخشی دارو در فرد، قابل افزایش (تا ماکزیمم ۱۰۰ میلی‌گرم) و با استناد به عوارض جانبی آن و همچنین در افراد مبتلا به اختلالات عملکرد کبد و یا کلیه قابل کاهش است. پریگرا® نهایتا یک بار در هر روز قابل تجویز است.

پیش از مصرف پریگرا® پزشک خود را از ابتلا به هر بیماری و یا مصرف هر داروی دیگر مطلع نمایید.

Reference:

www.ema.europa.eu | www.drugs.com
Der pharmacia Lettre ,2014,6(5):56-62

